

## Fauna chroniona w Nadleśnictwie Dretyń

Lp.	Gatunek nazwa polska nazwa łacińska	Miejsca występowania na gruntach Nadleśnictwa	Kategoria zagrożenia wg PCKZ
1	2	3	4
<b>BEZKRĘGOWCE</b>			
<b>OWADY</b>			
1.	Czerwończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	118g; 147m; 420c; 452j;	LC
2.	Zalotka większa <i>Leucorrhinia pectoralis</i>	99d; 160k;	
<b>KRĘGOWCE</b>			
<b>PŁAZY</b>			
3.	Grzebiuszka ziemna <sup>(2)</sup> <i>Pelobates fuscus</i>	Teren całego Nadleśnictwa.	LC
4.	Traszka grzebieniasta <sup>(2)</sup> <i>Triturus cristatus</i>	320g; 420a; 452h;	NT
5.	Ropucha paskówka <sup>(2)</sup> <i>Epidalea calamita</i>	Występuje na pograniczu borów sosnowych.	LC
6.	Ropucha szara <sup>(2)</sup> <i>Bufo bufo</i>	Teren całego Nadleśnictwa.	LC
7.	Żaba jeziorkowa <sup>(2)</sup> <i>Rana lessonae</i>	Niewielkie jeziora, oczka wodne, stawy.	LC
8.	Żaba moczarowa <sup>(2)</sup> <i>Rana arvalis</i>	Występuje na terenach podmokłych.	LC
9.	Żaba śmieszka <sup>(2)</sup>  <i>Rana ridibunda</i>	Duże zbiorniki wodne, takie, jak jeziora, stawy, rozlewiska rzeczne, śródlądne stawy, rowy melioracyjne.	LC
10.	Żaba trawna <sup>(2)</sup> <i>Rana temporaria</i>	Teren całego Nadleśnictwa.	LC
<b>GADY</b>			
11.	Jaszczurka zwinka <i>Lecerta agilis</i>	Teren całego Nadleśnictwa.	
12.	Padalec zwyczajny <i>Anguis fragilis</i>	Teren całego Nadleśnictwa.	
13.	Zaskroniec zwyczajny <i>Natrix natrix</i>	Teren całego Nadleśnictwa.	LC
14.	Żmija zygzakowata <sup>(2)</sup> <i>Vipera berus</i>	Teren całego Nadleśnictwa.	LC
15.	Żółw błotny <sup>(1) (2)</sup> <i>Emys orbicularis</i>	Leśnictwo Węgorzyno.	EN
<b>PTAKI</b>			
16.	Bielik <sup>(1)</sup> <i>Haliaeetus albicilla</i>	Leśnictwo Plewiska.	LC
17.	Błotniak stawowy <sup>(2)</sup> <i>Circus aeruginosus</i>	Trzcinowiska wokół jezior i stawów rybnych, torfowiska z zaroślami wierzbowymi, oczka wodne wśród pól uprawnych.	LC

18.	Bocian czarny <sup>(1) (2)</sup> <i>Ciconia nigra</i>	Leśnictwo Tursko.	LC
19.	Dzięcioł czarny <sup>(2)</sup> <i>Dryocopus martius</i>	Ze względu na rozległe kompleksy leśne gatunek rozpowszechniony.	LC
20.	Dzięcioł średni <sup>(2)</sup> <i>Dendrocopus medius</i>	Ze względu na stosunkowo rozległe kompleksy leśne i dużą ilość terenów podmokłych, gatunek rozpowszechniony.	LC
21.	Jastrząb gołąbjarz <i>Accipiter gentilis</i>	Stare, luźne drzewostany iglaste i mieszane w pobliżu łąk, pól uprawnych i innych terenów otwartych.	LC
22.	Krogulec <i>Accipiter nisus</i>	Skraje lasu w pobliżu pól z kępami drzew, w tym 30-50 letnie świerkowe i sosnowe drągowiny oraz śródpolne zagajniki.	LC
23.	Łabędź niemy <i>Cygnus olor</i>	Stosunkowo liczny nad jeziorami i rzekami.	LC
24.	Myszołów zwyczajny <i>Buteo buteo</i>	Otwarte tereny, skraje lasu oraz śródpolne zadrzewienia.	LC
25.	Orlik krzykliwy <sup>(1)</sup> <i>Aquila pomarina</i>	Leśnictwo Węgorzyno.	LC
26.	Perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	Stosunkowo liczny nad jeziorami.	LC
27.	Perkozek <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Stosunkowo liczny nad jeziorami.	LC
28.	Zimorodek <sup>(2)</sup> <i>Albedo atthis</i>	Stosunkowo liczny nad rzekami i jeziorami.	LC
29.	Żuraw <sup>(2)</sup> <i>Grus grus</i>	3d; 4b; 13a; 39d,i; 77c; 80b; 83b; 102f; 125d; 138j; 153c,h; 156b; 161p; 168f,i; 170b; 180b; 199f; 201g; 213f; 214Ag,i; 231b; 237h; 239c; 242i,k,m; 244p,r; 246d; 250k; 252i,k,m; 253j,x; 255l; 267c; 270f; 291f; 294i; 296i; 247c; 248l; 296Ak; 297a; 300c; 306i; 311Ad,l,m; 324m; 384d; 390a; 393k; 394g,h,l; 396c; 398f; 399a-c; 400b; 401c,f; 404f; 405g; 409d; 414c,k; 415f; 419c,i; 420h,l,p; 421d,g; 422d; 423j; 425i; 429a; 430d; 434b; 435c; 438k,n; 440h; 441h; 443b; 451d; 452j; 454a,i; 455c; 456d; 458g; 486g; 487h; 530k; 545g;	LC
<b>SSAKI</b>			
30.	Wydra <i>Lutra lutra</i>	21b; 371b; 403Al.	NT